



DECLARATION OBLIGATOIRE D'AVORTEMENT BOVIN

(Décret N°65-1166 du 24-12-65 et arrêté ministériel du 20-03-90)

Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy de Dôme

TERANA du Puy de Dôme

20 rue Aimé Rudel - B.P 42 MARMILHAT - 63370 LEMPDES

TEL : 04-73-90-10-41 FAX : 04-73-91-61-04 MAIL : puydedome@labo-terana.fr

<u>Encadré réservé au laboratoire</u>	Date de réception et visa :	N° de dossier :
Eleveur, raison sociale :	Vétérinaire sanitaire :	
N° de cheptel :	N° ordre du cabinet :	
Adresse :	Date du prélèvement :	
Atelier prélevé : ☐ laitier ☐ allaitant	Kms parcourus A/R :	
« J'autorise la transmission des résultats au GDS et à GDS France, à des fins de surveillance collective »	Signature :	
Signature :		

Avortement isolé ou en série hors protocole OSCAR :

☐ Protocole obligatoire uniquement : recherche de brucellose sur sérum (EAT) – prise en charge 100% par la DDPP63☐ Protocole obligatoire + recherche *Salmonella spp.* et *Listeria monocytogenes* en élevage « lait cru »

Brucellose : recherche sur sérum par EAT – prise en charge 100% par la DDPP63

Salmonella spp. et *Listeria monocytogenes* : recherche sur écouvillons endocervicaux (minimum 2), placenta ou contenu stomacal de l'avorton par culture bactériologique – prise en charge 80 % par le GDS si éleveur adhérent☐ Protocole obligatoire (brucellose) + demande d'analyses hors OSCAR sans prise en charge GDS

Analyses souhaitées : _____

Série abortive OSCAR :

☐ Avortements rapprochés (au min. 2 avortements en moins d'1 mois)☐ Avortements espacés (3 avortements ou plus en 9 mois)

Vaccination		
Vaccins (BVD, fièvre Q, chlamydirose...)	Date de la vaccination	Concerne le ou les lots ayant avorté
		☐ Oui ☐ Non
		☐ Oui ☐ Non
BVD		
Statut épidémiologique du cheptel	☐ Largement séropositif ☐ Largement séronégatif ☐ Inconnu	
Prélèvements OSCAR		
Vaches avortées et/ou avortons	Minimum requis par vache : 2 tubes secs, 1 tube EDTA, placenta et/ou 3 écouvillons endocervicaux, rate et contenu stomacal de l'avorton Si possible : encéphale/tête de l'avorton (PCR Neospora), foie de l'avorton	
Vaches congénères (entre 3 et 6)	2 tubes secs par vache	
Jeunes bovins sentinelles (entre 6 et 10)	1 tube sec par bovin	
Protocole d'analyses demandées		
OSCAR	☐ Protocole OSCAR Fièvre Q, néosporose, BVD, <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , recherche mycologique.	Tarif 2019 : 265€ HT Prise en charge GDS à 80% Reste à charge de l'éleveur 53€ HT
	Suspicion clinique : - Maladie : _____ - Symptômes : _____ Ce pathogène sera recherché en priorité avec une prise en charge par le GDS à 80 % s'il en a été averti et a donné son accord au préalable.	
	A la carte Analyses Oscar complémentaires : pas de prise en charge systématique par le GDS (décision raisonnée entre le GDS et le vétérinaire sanitaire avant réalisation) ☐ <i>Anaplasma marginale</i> (PCR et sérologie sur sang de l'animal avorté) ☐ <i>Chlamydia abortus</i> (PCR sur placenta ou écouvillon endocervical de l'animal avorté et sérologie sur ses congénères) ☐ <i>Campylobacter</i> (PCR sur écouvillon endocervical de l'animal avorté) ☐ <i>Leptospires</i> (sérologie MAT sur l'animal avorté et ses congénères)	Tarifs 2019 : 36,72 € HT PCR, 14.08 € HT ELISA 36,72 € HT PCR, 8.31 € HT ELISA Nous contacter Sous-traitance Vetagro-Sup

Prélèvements sur les avortés					
Vaches avortées <u>depuis moins de 8 jours</u> N° à 10 chiffres	Date d'avortement estimée	Stade de gestation	Délai avortement et visite	Echantillons prélevés	
Vache avortée 1 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ < 7 j ☐ 7 à 15 j ☐ > 15 j ☐ Inconnu	☐ Sang sur tube sec (au moins 2) ☐ Sang sur tube EDTA ☐ Ecouvillons endocervicaux (au moins 3) ☐ Placenta (prélevé dans l'utérus)	☐ Avorton : contenu stomacal ☐ Avorton : rate / foie ☐ Avorton : encéphale/tête ☐ Autres : _____
Vache avortée 2 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ < 7 j ☐ 7 à 15 j ☐ > 15 j ☐ Inconnu	☐ Sang sur tube sec (au moins 2) ☐ Sang sur tube EDTA ☐ Ecouvillons endocervicaux (au moins 3) ☐ Placenta (prélevé dans l'utérus)	☐ Avorton : contenu stomacal ☐ Avorton : rate / foie ☐ Avorton : encéphale/tête ☐ Autres : _____
Vache avortée 3 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ < 7 j ☐ 7 à 15 j ☐ > 15 j ☐ Inconnu	☐ Sang sur tube sec (au moins 2) ☐ Sang sur tube EDTA ☐ Ecouvillons endocervicaux (au moins 3) ☐ Placenta (prélevé dans l'utérus)	☐ Avorton : contenu stomacal ☐ Avorton : rate / foie ☐ Avorton : encéphale/tête ☐ Autres : _____
Prélèvements sur les congénères					
3 à 6 vaches appartenant au lot touché par les avortements N° à 10 chiffres	Date d'avortement estimée (à renseigner si avortement depuis plus de 8 jours et moins de 9 mois)	Stade de gestation (à renseigner si avortement depuis plus de 8 jours et moins de 9 mois)	Délai avortement et visite (à renseigner si avortement depuis plus de 8 jours et moins de 9 mois)	Echantillons prélevés	
Vache congénère 1 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ 7 à 15 j ☐ Inconnu ☐ > 15 j	☐ Sang (2 tubes secs)	
Vache congénère 2 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ 7 à 15 j ☐ Inconnu ☐ > 15 j	☐ Sang (2 tubes secs)	
Vache congénère 3 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ 7 à 15 j ☐ Inconnu ☐ > 15 j	☐ Sang (2 tubes secs)	
Vache congénère 4 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ 7 à 15 j ☐ Inconnu ☐ > 15 j	☐ Sang (2 tubes secs)	
Vache congénère 5 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ 7 à 15 j ☐ Inconnu ☐ > 15 j	☐ Sang (2 tubes secs)	
Vache congénère 6 N° _____		☐ 1 ^{er} tiers ☐ 3 ^{ème} tiers ☐ 2 ^{ème} tiers ☐ Inconnu	☐ 7 à 15 j ☐ Inconnu ☐ > 15 j	☐ Sang (2 tubes secs)	
6 à 10 jeunes bovins sentinelles âgés de 6 à 8 mois en contact avec le lot touché par les avortements : N° à 10 chiffres (élevage vaccinant BVD ou en cas de forte prévalence BVD)					Echantillons prélevés
Jeune bovin sentinelle n°1 : N° _____ bovin sentinelle n°4 : N° _____ bovin sentinelle n°7 : N° _____ bovin sentinelle n°10 : N° _____	Jeune bovin sentinelle n°2 : N° _____ Jeune bovin sentinelle n°5 : N° _____ Jeune bovin sentinelle n°8 : N° _____	Jeune bovin sentinelle n°3 : N° _____ Jeune bovin sentinelle n°6 : N° _____ Jeune bovin sentinelle n°9 : N° _____	Jeune Jeune Jeune	☐ Sang (1 tube sec)	